

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7-14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Echinaforce® tablete in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Echinaforce® tablete
3. Kako uporabljati zdravilo Echinaforce® tablete
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Echinaforce® tablete
6. Dodatne informacije

Echinaforce® tablete

Echinacea purpurea: herba, recentis tinctura

Echinacea purpurea: radix, recentis tinctura

1. Kaj je zdravilo Echinaforce® tablete in za kaj ga uporabljamo

Tablete Echinaforce® so zdravilo rastlinskega izvora, pripravljeno iz sveže, cvetoče zeli in korenin škrlatne ehinaceje.

Zdravilo povečuje imunsko odpornost telesa. Uporabljajte ga za preprečevanje prehlada in pospeševanje zdravljenja znakov prehlada kot so: kašelj, nahod, solzenje, vnetje žrela, glavobol in mišične bolečine.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Echinaforce® tablete

Ne uporabljajte tablet Echinaforce®

- če ste preobčutljivi na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov,
- če ste preobčutljivi na rastline iz družine košaric (latinsko Compositae), kot sta arnika in rman ali na ekstrakte iz njih,
- če imate napredujoče sistemske bolezni, na primer tuberkulozo, levkemijo, kolagenozo, multiplo sklerozo, AIDS, okužbo z virusom HIV in druge avtoimunske bolezni.

Bodite posebno pozorni pri uporabi tablet Echinaforce®

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 4 let. Otroci, stari med 4 in 14 let naj se pred uporabo tablet Echinaforce® posvetujejo z zdravnikom. Če znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 do 14 dneh, morate obiskati zdravnika.

Uporaba drugih zdravil

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Uporaba tablet Echinaforce® skupaj s hrano in pijačo

Tablete zaužijte pol ure pred obrokom hrane.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

O škodljivosti tablet Echinaforce med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov. V skladu s splošno medicinsko prakso odsvetujemo uporabo nosečnicam in doječim materam, če se pred tem niso posvetovale z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah tablet Echinaforce®

Tablete vsebujejo laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako uporabljati zdravilo Echinaforce® tablete

Pri uporabi tablet Echinaforce® natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Običajen odmerek je:

- za odrasle: trikrat po 2 tableti na dan, skupaj dnevno 6 tablet
- za otroke od 4 do 14 let: trikrat po 1 tableto na dan, po posvetu z zdravnikom, skupaj dnevno tri tablete.

Tableto vzemite pred obrokom z nekaj vode ali jo raztopite v ustih. Zdravilo je primerno samo za peroralno uporabo. Tablet ne uporabljajte neprekinjeno več kot 8 tednov. Če menite, da je učinek tablet Echinaforce® premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek tablet Echinaforce®, kot bi smeli

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom. Do sedaj ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Če ste pozabili uporabiti tablete Echinaforce®

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega. Nadaljujte zdravljenje po predpisani shemi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi tablete Echinaforce neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. V redkih primerih se lahko ob jemanju tablet Echinaforce pojavi preobčutljivostna reakcija na koži. Če jo opazite, takoj prenehajte jemati tablete in o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje zdravila Echinaforce® tablete

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tablete Echinaforce® shranjujte v originalnem vsebniku pri temperaturi med 15 in 25°C.

Tablet ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte tablet, če je bil varnostni mehanizem zaporka pred prvim odpiranjem odlomljen. Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebujejo tablete Echinaforce®

1 tableta vsebuje:

- 860 mg tinkture zeli sveže škrlatne ehinaceje (Echinacea purpurea: herba, recentis tinctura), razmerje droga : ekstrakcijsko topilo je 1 : 12; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol,
- 45 mg tinkture korenin sveže škrlatne ehinaceje (Echinacea purpurea: radix, recentis tinctura), razmerje droga : ekstrakcijsko topilo je 1 : 11; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol.

Pomožne snovi: magnezijev stearat, laktoza monohidrat in krompirjev škrob.

Vsebina pakiranja

Na voljo je pakiranje v škatli s stekleničko, v kateri je 60 tablet in v škatli s stekleničko, v kateri je 120 tablet.

Način in režim izdaje tablet Echinaforce®

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/5240216, faks: 01/5240214, e-pošta: farmedica@farmedica.si

Proizvajalec

Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, Švica

Izdelovalca

Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000 Ljubljana
Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo odobreno: 25. 03. 2008